

درسنامه + آزمون‌های مبحثی و جامع + پاسخ‌های تشریحی

موج آزمون ریاضے

نظام جدید


کاظم اجلالی، ارشک حمیدی



رشته
تجربی

ویژه
نظام جدید
آموزشی

انتگرالگو



بازه و مجموعه

فصل ۱

بازه و مجموعه

مجموعه‌های زیر از مهم‌ترین مجموعه‌های اعداد هستند که با آن‌ها سر و کار داریم:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\} \text{ : مجموعه اعداد طبیعی}$$

$$\mathbb{W} = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \text{ : مجموعه اعداد حسابی}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \text{ : مجموعه اعداد صحیح}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\} \text{ : مجموعه اعداد گویا}$$

$$\mathbb{Q}' = \{a \mid a \notin \mathbb{Q}\} \text{ : مجموعه اعداد گنگ}$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' \text{ : مجموعه اعداد حقیقی}$$

رابطه‌های زیر بین مجموعه‌های بالا برقرار است:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

نمادهای \mathbb{Z}^+ ، \mathbb{Z}^- ، \mathbb{Q}^+ ، \mathbb{Q}^- ، \mathbb{R}^+ ، \mathbb{R}^- و ... را نیز می‌توان به کار برد. مثلاً \mathbb{Z}^- یعنی مجموعه اعداد صحیح منفی. همچنین \mathbb{Q}^+ یعنی مجموعه اعداد گویای مثبت و ...

برخی از زیرمجموعه‌های اعداد حقیقی که بسیار کاربرد دارند، بازه‌ها هستند. اگر $a < b$ ، انواع بازه‌ها را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \text{ بازه باز } (a, b)$$



$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \text{ بازه بسته } [a, b]$$



$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \text{ بازه نیم باز } [a, b)$$



$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} \text{ بازه نیم باز } (a, b]$$




$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\} \text{ بازه نیم باز } [a, +\infty)$$



$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\} \text{ بازه نیم باز } (-\infty, a]$$



$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\} \text{ بازه نیم باز } (a, +\infty)$$



$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\} \text{ بازه نیم باز } (-\infty, a)$$



کل اعداد حقیقی را با بازه $(-\infty, +\infty)$ نشان می‌دهیم.

مجموعه‌ای که تعداد اعضایش عددی حسابی باشد، **مجموعه‌ای متناهی** است و مجموعه‌ای که متناهی نباشد، **مجموعه‌ای نامتناهی** است.

هر زیرمجموعه از مجموعه‌ای متناهی، خودش متناهی است. پس اگر مجموعه‌ای زیرمجموعه‌ای نامتناهی داشته باشد، خودش هم نامتناهی است.

هر مجموعه یا متناهی است یا نامتناهی. □

مجموعه‌های \mathbb{N} ، W ، Z ، Q ، Q' و \mathbb{R} نامتناهی‌اند. همچنین بازه‌ها، مجموعه‌هایی نامتناهی هستند. □

در هر موضوع، مجموعه‌ای که تمام مجموعه‌های مورد بحث در آن موضوع زیرمجموعه آن باشند، **مجموعه مرجع** نامیده می‌شود. □

اگر A زیرمجموعه دلخواهی از مجموعه مرجع U باشد، مجموعه $U - A$ را **متمم** A در U می‌نامند و با A' نشان می‌دهند. پس مجموعه A' از همه عضوهایی از U تشکیل شده است که عضو A نیستند. □

اگر A مجموعه‌ای متناهی باشد، تعداد اعضای آن را با $n(A)$ نشان می‌دهیم. □

تعداد اعضای اجتماع دو مجموعه A و B از رابطه زیر به دست می‌آید: □

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

اگر A ، B و C سه مجموعه متناهی باشند، تعداد اعضای اجتماع آن‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید: □

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

اگر A و B دو مجموعه باشند که عضو مشترک ندارند، گوییم A و B جدا از هم (مجزا) هستند. در این صورت $n(A \cap B) = 0$. □

بازه و مجموعه (۱)

زمان: ۲۳ تا ۲۵
پاسخ: ۲۳ تا ۲۵

محاسبات

- ۱- به ازای چند عدد طبیعی مانند n عدد $\frac{1}{4}$ در بازه $[\frac{1}{n+3}, \frac{1}{n+1}]$ قرار دارد؟
 (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ صفر
- ۲- اگر $0 < a < 1$ ، مجموعه $(-a, a) \cap (-a^2, a^3)$ کدام است؟
 (۱) $\{0\}$ (۲) $(-a, a)$ (۳) $(-a^2, a^3)$ (۴) $(-a, -a^2)$
- ۳- اگر $A_n = [1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}]$ ، حاصل $A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n$ کدام است؟
 (۱) $[\frac{9}{10}, \frac{11}{10}]$ (۲) $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ (۳) $[\frac{1}{2}, \frac{11}{10}]$ (۴) $[\frac{9}{10}, \frac{3}{2}]$
- ۴- اگر $A = (-1, 1]$ ، $B = [a, b)$ ، $A \cap B = [0, 1]$ و $A \cup B = (-1, 4)$ ، مقدار $a+b$ کدام است؟
 (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴
- ۵- اگر اشتراک دو بازه $(-\infty, a+4]$ و $[-2a+1, +\infty)$ مجموعه‌ای تک‌عضوی باشد، مقدار a کدام است؟
 (۱) -۴ (۲) -۳ (۳) -۲ (۴) -۱
- ۶- اگر اشتراک دو بازه $(-2, 4]$ و $(2a, a)$ تهی نباشد، مجموعه مقادیر ممکن برای a کدام است؟
 (۱) $(-1, 0)$ (۲) $(-2, 0)$ (۳) $(-4, 0)$ (۴) $(-\infty, -2)$
- ۷- اگر مجموعه مرجع \mathbb{N} باشد، $A = \{1, 3, 4, 5\}$ ، $B' = \{1, 2, 5, 7\}$ و $C' = \{2, 5\}$ ، مجموعه $A - (B \cap C)$ کدام است؟
 (۱) $\{1\}$ (۲) $\{1, 5\}$ (۳) $\{2, 5\}$ (۴) $\{5\}$
- ۸- اگر مجموعه مرجع \mathbb{Z} باشد و $A = \{x \mid |x-5| > 3\}$ ، مجموعه A' چند عضو دارد؟
 (۱) ۷ (۲) ۸ (۳) ۱۰ (۴) ۱۱
- ۹- اگر $A \subseteq B$ و A و B مجموعه‌ای نامتناهی باشد، آنگاه کدام مجموعه قطعاً نامتناهی است؟
 (۱) A' (۲) B' (۳) $A \cap B'$ (۴) $A' \cup B$
- ۱۰- اگر A مجموعه‌ای متناهی و B مجموعه‌ای نامتناهی باشد، کدام مجموعه قطعاً متناهی است؟
 (۱) $A \cap B'$ (۲) $A \cup B$ (۳) $A' \cup B$ (۴) $A' \cap B$
- ۱۱- اگر A ، B و C سه زیرمجموعه از مجموعه مرجع U باشند، $n(A) + n(B') = 17$ و $n(B) + n(A') = 13$ ، مقدار $n(C) + n(C')$ چقدر است؟
 (۱) ۱۲ (۲) ۱۳ (۳) ۱۴ (۴) ۱۵
- ۱۲- اگر $n(A \cup B) + n(A \cap B) = 24$ و $n(A) = 2n(B)$ ، مقدار $n(B)$ چقدر است؟
 (۱) ۴ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴) ۱۰
- ۱۳- در بررسی ۴۵ محصول معیوب یک کارخانه که عیوب A و B را دارند، مشخص شد ۳۰ عدد از محصولات، عیب A را دارند و ۲۰ عدد از آنها فقط عیب A را دارند. چند محصول این شرکت فقط عیب B را دارند؟
 (۱) ۱۵ (۲) ۱۰ (۳) ۵ (۴) ۲۰

۱۴- اگر $\frac{n(A)}{7} = \frac{n(B)}{12} = \frac{n(A \cap B)}{4}$ و $n(A \cup B) = 60$ ، مقدار $n(A)$ چقدر است؟

- ۲۴ (۴) ۲۸ (۳) ۳۲ (۲) ۳۶ (۱)

۱۵- اگر مجموعه مرجع U باشد، $n(U) = 26$ ، $n(A \cup B) = 14$ و $n(A) = n(A')$ ، مقدار $n(B - A)$ چقدر است؟

- ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۱۶- اگر $n(A) = 2n(B)$ و $n(A \cup B) = 5n(A \cap B) = 20$ ، مقدار $\frac{n(A - B)}{n(B - A)}$ چقدر است؟

- ۳ (۴) ۴ (۳) ۶ (۲) ۷ (۱)

۱۷- اگر $n(A) = n(B) + 3$ ، $n(A - B) = 2n(B - A)$ و $n(A \cap B) = 5$ ، مقدار $n(A \cup B)$ چقدر است؟

- ۱۶ (۴) ۱۵ (۳) ۱۴ (۲) ۱۳ (۱)

۱۸- از ۱۰۰ دانش‌آموز پایه دوازدهم ۸۵ نفر به ریاضی و ۷۰ نفر به فیزیک علاقه دارند. حداقل چند نفر به هر دو درس علاقه دارند؟

- ۶۵ (۴) ۶۰ (۳) ۵۵ (۲) ۵۰ (۱)

۱۹- اگر U مجموعه مرجع باشد، $n(U) = 23$ ، $n(A) = 10$ و $n(B) = 7$ ، بیشترین مقدار ممکن $n(A' \cap B')$ چقدر است؟

- ۱۴ (۴) ۱۳ (۳) ۱۲ (۲) ۱۱ (۱)

۲۰- اگر $n(A) = 3k - 1$ ، $n(B) = 3$ و $n(A \cap B) = k - 2$ ، بیشترین مقدار ممکن $n(A \cup B)$ چقدر است؟

- ۱۶ (۴) ۱۴ (۳) ۸ (۲) ۶ (۱)

بازه و مجموعه (۲)



محاسبات

۱- اگر نقطه وسط بازه $[-a^2, 2a^2+1]$ روی محور اعداد حقیقی متناظر با عدد ۵ باشد، فاصله دو سر بازه از یکدیگر چقدر است؟

- (۱) ۹ (۲) ۱۹ (۳) ۲۸ (۴) ۳۶

۲- اگر عدد a عضو بازه $(2a-1, 3-3a)$ باشد، مجموعه مقادیر ممکن برای a کدام است؟

- (۱) $(-\infty, 1)$ (۲) $(-\infty, \frac{3}{4})$ (۳) $(-\infty, \frac{4}{5})$ (۴) $(-\infty, 0)$

۳- اگر $(b, 4) \cap [-2, a) = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{4})$ ، حاصل $(b, a) \cup (-2a-1, b)$ کدام است؟

- (۱) $(-3, 1)$ (۲) $(-2, \frac{1}{4})$ (۳) $(1, 4)$ (۴) $(-2, \frac{1}{4}) - \{-\frac{1}{3}\}$

۴- اگر $[a, 2] \cap [a+2, b] = [-2, 1]$ ، مقدار $a-b$ کدام است؟

- (۱) -۵ (۲) -۴ (۳) -۳ (۴) صفر

۵- اگر اجتماع دو بازه $(-\infty, 2a+1]$ و $(3a-1, +\infty)$ برابر مجموعه اعداد حقیقی شود، کدام یک درست است؟

- (۱) $a=2$ (۲) $a>2$ (۳) $a\leq 2$ (۴) $a<2$

۶- اگر اشتراک دو بازه $[1-2a, 1+2a]$ و $[-5, -3]$ مجموعه‌ای تک‌عضوی باشد، مقدار a کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) -۳

۷- اگر مجموعه مرجع $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ باشد، $A = \{1, 3, 5\}$ ، $B = \{3, 5\}$ و $C = \{1, 2, 5\}$ ، مجموعه

$C \cap (A \cap B)'$ کدام است؟

- (۱) $\{1\}$ (۲) $\{1, 2\}$ (۳) $\{1, 5\}$ (۴) $\{2, 5\}$

۸- اگر $A = (1, 2]$ ، $B = (-1, 1]$ و $C = (-\infty, 0)$ ، حاصل $(A' - B') - C'$ کدام است؟

- (۱) $(-1, 1]$ (۲) $(0, 2)$ (۳) $(-1, 2)$ (۴) $(-1, 0)$

۹- اگر مجموعه مرجع، مجموعه اعداد طبیعی یک‌رقمی باشد، $A = \{1, 6, 7\}$ ، $B = \{3, 5, 7\}$ و $C' = \{1, 4, 5, 6\}$ ،

مجموعه $(A \cap B') \cup C$ چند عضو دارد؟

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷

۱۰- اگر $A = [n-1, 2n-1]$ و $B = [5, 7]$ دو مجموعه جدا از هم باشند، n چند عدد طبیعی نمی‌تواند باشد؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

۱۱- کدام یک درست است؟

- (۱) اگر $A \cup B$ نامتناهی باشد، آن‌گاه A و B نامتناهی‌اند.
 (۲) اگر $A \cap B$ متناهی باشد، آن‌گاه A و B متناهی‌اند.
 (۳) اگر $A \cup B$ متناهی باشد، آن‌گاه A و B متناهی‌اند.
 (۴) اگر $A \cap B$ نامتناهی باشد، آن‌گاه A یا B می‌توانند متناهی باشند.

۱۲- اگر $n(A \cup B) + n(A \cap B) = 24$ و $n(A) - n(B) = 4$ ، مقدار $n(B)$ چقدر است؟

- ۱۰ (۱) ۱۱ (۲) ۱۲ (۳) ۱۳ (۴)

۱۳- اگر $A \subseteq B$ ، $n(A') = 14$ ، $n(B') = 10$ و $n(A \cup B) = 9$ ، مقدار $n(A)$ چقدر است؟

- ۵ (۱) ۶ (۲) ۷ (۳) ۸ (۴)

۱۴- اگر $n(A) + n(B) = 24$ ، $n(A \cup B) = 16$ و $n(B - A) = 3$ ، مقدار $n(A - B)$ چقدر است؟

- ۵ (۱) ۶ (۲) ۷ (۳) ۸ (۴)

۱۵- اگر $n(A \cup B) = 44$ و $n(A \cap B) = 2n(A - B) = 3n(B - A)$ ، مقدار $n(B)$ چقدر است؟

- ۲۴ (۱) ۲۸ (۲) ۳۲ (۳) ۳۶ (۴)

۱۶- در کلاسی که ۳۰ دانش آموز دارد، ۱۸ نفر جای دوست دارند و ۱۵ نفر قهوه. حداکثر چند نفر از دانش آموزان این

کلاس نه جای دوست دارند نه قهوه؟

- ۶ (۱) ۱۲ (۲) ۱۰ (۳) ۱۸ (۴)

۱۷- اگر A زیرمجموعه B نباشد، $n(A) = 5$ و $n(B) = 7$ ، مجموع بیشترین مقدار و کمترین مقدار ممکن $n(A \cup B)$

چقدر است؟

- ۱۷ (۱) ۱۸ (۲) ۱۹ (۳) ۲۰ (۴)

۱۸- اگر $A \subseteq B$ و $n(A) + 2n(B) = 14$ ، کمترین مقدار ممکن $n(A \cup B)$ چقدر است؟


- ۷ (۱) ۶ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴)

۱۹- اگر $n(A) = 2n(B)$ و $n(A \cup B) = 35$ ، بیشترین مقدار ممکن $n(A - B)$ چقدر است؟

- ۱۹ (۱) ۲۰ (۲) ۲۲ (۳) ۲۳ (۴)


۲۰- اگر $5n(A \cap B) = 3n(A) = 2n(B)$ ، کمترین مقدار ممکن $n(A \cup B)$ چقدر است؟

- ۱۵ (۱) ۱۹ (۲) ۲۱ (۳) ۲۷ (۴)



پاسخ‌های تشریحی

بنابراین $a > -2$. از روی شکل‌های زیر معلوم است که اگر $-2 < a < 0$ ، اشتراک بازه‌های $[-2, 4]$ و $(2a, a)$ تهی نیست.



۷- گزینه ۲ توجه کنید که

$$B = \{3, 4, 6, 8, 9, 10, \dots\}$$

$$C = \{1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, \dots\}$$

بنابراین $B \cap C = \{3, 4, 6, 8, 9, \dots\}$ و در نتیجه

$$A - (B \cap C) = \{1, 5\}$$

۸- گزینه ۱ راه‌حل اول توجه کنید که

$$|x-5| > 3 \Rightarrow \begin{cases} x-5 > 3 \\ x-5 < -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 8 \\ x < 2 \end{cases}$$

بنابراین $A = \{\dots, 0, 1, 9, 10, \dots\}$ در نتیجه

$$A' = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

یعنی $n(A') = 7$.

راه‌حل دوم چون $A = \{x \mid |x-5| > 3\}$ ، پس

$$A' = \{x \mid |x-5| \leq 3\}$$

از نابرابری $|x-5| \leq 3$ نتیجه می‌شود

$$-3 \leq x-5 \leq 3 \Rightarrow 2 \leq x \leq 8$$

مجموعه مرجع \mathbb{Z} است، پس

$$A' = \{2, 3, \dots, 8\} \Rightarrow n(A') = 7$$

۹- گزینه ۴ چون A نامتناهی است، پس B هم نامتناهی است و اجتماع آن با هر مجموعه دیگری نامتناهی است. یعنی $A' \cup B$ نامتناهی است.

۱۰- گزینه ۱ B نامتناهی است، پس B' می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد. ولی چون A متناهی است، پس $A \cap B'$ متناهی است. توجه کنید که چون A متناهی است، A' می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد. پس متناهی یا نامتناهی بودن $A' \cap B$ مشخص نیست. همچنین چون B نامتناهی است، اجتماع آن با هر مجموعه‌ای نامتناهی است. یعنی $A' \cup B$ و $A \cup B$ نامتناهی هستند.

۱۱- گزینه ۴ توجه کنید که

$$\begin{cases} n(A) + n(B') = 17 \\ n(B) + n(A') = 13 \end{cases} \Rightarrow n(A) + n(A') + n(B) + n(B') = 30$$

$$n(U) + n(U) = 30 \Rightarrow n(U) = 15$$

بنابراین $n(C) + n(C') = n(U) = 15$

آزمون ۱



۱- گزینه ۲ عدد $\frac{1}{4}$ باید از $\frac{1}{n+3}$ بزرگ‌تر باشد، یعنی

$$\frac{1}{n+3} < \frac{1}{4} \Rightarrow n+3 > 4 \Rightarrow n > 1$$

عدد $\frac{1}{4}$ باید از $\frac{1}{n+1}$ بیشتر نباشد، یعنی


$$\frac{1}{n+1} \geq \frac{1}{4} \Rightarrow n+1 \leq 4 \Rightarrow n \leq 3$$

بنابراین عدد طبیعی n می‌تواند برابر ۲ یا ۳ باشد.

۲- گزینه ۳ چون $0 < a < 1$ ، پس $a^3 < a$ و $-a < -a^2$ ،

بنابراین

$$(-a, a) \cap (-a^2, a^3) = (-a^2, a^3)$$



۳- گزینه ۲ مجموعه‌های A_1, A_2, A_3, \dots به شکل

زیر هستند:

$$A_2 = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right], A_3 = \left[\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right], \dots, A_{10} = \left[\frac{9}{10}, \frac{11}{10}\right]$$

واضح است که مجموعه A_4 شامل تمام مجموعه‌های دیگر است.

پس اجتماع تمام این مجموعه‌ها همان A_4 است.

۴- گزینه ۴ از تساوی $(-1, 1] \cap [a, b) = [0, 1]$ معلوم

می‌شود $a = 0$. از تساوی $(-1, 1] \cup [a, b) = (-1, 4)$ معلوم

می‌شود $b = 4$. بنابراین $a + b = 4$.

۵- گزینه ۴ اشتراک این دو بازه تنها زمانی تک‌عضوی است

که ابتدای بازه $(-\infty, a+4]$ بر انتهای بازه $[-2a+1, +\infty)$ منطبق


باشد. در نتیجه

$$-2a+1 = a+4 \Rightarrow a = -1$$

۶- گزینه ۲ چون $(2a, a)$ یک بازه است، پس $2a < a$ و در

نتیجه $a < 0$. از روی شکل‌های زیر معلوم است که اگر $a \leq -2$

اشتراک بازه‌های $[-2, 4]$ و $(2a, a)$ تهی است:



بنابراین

$$\begin{cases} n(A) = 2n(B) - 5 \\ n(A) = n(B) + 3 \end{cases}$$

$$n(A) = 11, n(B) = 8$$

در نتیجه

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 11 + 8 - 5 = 14$$

۱۸- گزینه ۲ فرض کنید A مجموعه علاقه‌مندان به ریاضی

و B مجموعه علاقه‌مندان به فیزیک باشد. اگر تعداد کسانی که به

هیچ کدام از این دو درس علاقه‌مند نیستند x باشد، آن‌گاه

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$100 - x = 85 + 70 - n(A \cap B)$$

پس $n(A \cap B) = 55 + x$. برای اینکه $n(A \cap B)$ حداقل باشد، باید

$x = 0$ ، بنابراین حداقل مقدار ممکن $n(A \cap B)$ برابر با ۵۵ است.

۱۹- گزینه ۳ ابتدا توجه کنید که

$$n(A') = n(U) - n(A) = 23 - 10 = 13$$

$$n(B') = n(U) - n(B) = 23 - 7 = 16$$

اکنون توجه کنید که

$$n(A' \cap B') \leq n(A') = 13$$

۲۰- گزینه ۳ توجه کنید که

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 3k - 1 + 3 - (k - 2) = 2k + 4$$

از طرف دیگر،

$$n(A \cap B) \leq n(B)$$

$$k - 2 \leq 3 \Rightarrow k \leq 5$$

بنابراین

$$n(A \cup B) = 2k + 4 \leq 2 \times 5 + 4 = 14$$

آزمون ۲



۱- گزینه ۳ نقطه وسط پاره‌خط، متناظر با میانگین ابتدا و

انتهای بازه است، یعنی

$$\frac{2a^2 + 1 + (-a^2)}{2} = \frac{a^2 + 1}{2} = 5$$

$$a^2 = 9$$

بنابراین بازه مورد نظر $[-9, 19]$ است و فاصله دو سر آن از یکدیگر

برابر است با $19 - (-9) = 28$.

۱۲- گزینه ۳ توجه کنید که

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

بنابراین

$$n(A \cup B) + n(A \cap B) = 2n(B) + n(B)$$


$$24 = 3n(B) \Rightarrow n(B) = 8$$

۱۳- گزینه ۱ تعداد محصولاتی که هر دو عیب را دارند برابر

است با $30 - 20 = 10$ ، یعنی ۱۰ محصول. تعداد محصولاتی که عیب B را

دارند برابر $45 - 20 = 25$ است، که ۱۰ تا از آن‌ها عیب A را نیز

دارند. پس ۱۵ محصول فقط عیب B را دارند.



۱۴- گزینه ۳ مقدار مشترک نسبت‌ها را برابر t می‌گیریم. در

این صورت

$$n(A) = 7t, n(B) = 12t, n(A \cap B) = 4t$$

در نتیجه

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$60 = 7t + 12t - 4t \Rightarrow 60 = 15t \Rightarrow t = 4$$

بنابراین $n(A) = 7t = 28$.

۱۵- گزینه ۱ ابتدا توجه کنید که

$$n(A) + n(A') = n(U)$$

$$2n(A) = 26 \Rightarrow n(A) = 13$$

از طرف دیگر،

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$14 = 13 + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(B) - n(A \cap B) = 1 \Rightarrow n(B - A) = 1$$

۱۶- گزینه ۴ ابتدا توجه کنید که

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$20 = 2n(B) + n(B) - 4 \Rightarrow 3n(B) = 24$$

$$n(B) = 8 \Rightarrow n(A) = 16$$

بنابراین

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 16 - 4 = 12$$

$$n(B - A) = n(B) - n(A \cap B) = 8 - 4 = 4$$

در نتیجه $\frac{n(A - B)}{n(B - A)} = \frac{12}{4} = 3$.

۱۷- گزینه ۲ توجه کنید که

$$n(A - B) = 2n(B - A)$$

$$n(A) - n(A \cap B) = 2n(B) - 2n(A \cap B)$$

$$n(A) = 2n(B) - n(A \cap B) = 2n(B) - 5$$

اکنون توجه کنید که شرط اینکه $[1-2a, 1+2a]$ بازه باشد این است که $1-2a < 1+2a$ ، یعنی $a > 0$. بنابراین تنها مقدار قابل قبول برای a برابر ۲ است.

۷- گزینه ۲ توجه کنید که $A \cap B = \{3, 5\}$ پس $(A \cap B)' = \{1, 2, 4, 6\}$ و

$$C \cap (A \cap B)' = \{1, 2\}$$

۸- گزینه ۴ ابتدا مجموعه‌های A' ، B' و C' را پیدا می‌کنیم:

$$A' = (-\infty, 1] \cup (2, +\infty)$$

$$B' = (-\infty, -1] \cup (1, +\infty)$$

$$C' = [0, +\infty)$$

بنابراین

$$A' - B' = (-1, 1]$$

و در نتیجه

$$(A' - B') - C' = (-1, 0)$$

۹- گزینه ۴ راه‌حل اول مجموعه مرجع $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$

است، پس

$$B' = \{1, 2, 4, 6, 8, 9\}, \quad C = \{2, 3, 7, 8, 9\}$$

در نتیجه

$$A \cap B' = \{1, 6\}$$

$$(A \cap B') \cup C = \{1, 2, 3, 6, 7, 8, 9\}$$

بنابراین مجموعه $(A \cap B') \cup C$ ، هفت عضو دارد.

راه‌حل دوم توجه کنید که

$$A \cap B' = A - B = \{1, 6\}$$

$$C = \{2, 3, 7, 8, 9\}$$

بنابراین


$$(A \cap B') \cup C = \{1, 6\} \cup \{2, 3, 7, 8, 9\}$$

$$= \{1, 2, 3, 6, 7, 8, 9\}$$

۱۰- گزینه ۴ اگر این دو مجموعه جدا از هم باشند، دو حالت

زیر پیش می‌آید:

حالت اول



$$2n-1 < 5 \Rightarrow n < 3$$

حالت دوم



$$n-1 > 7 \Rightarrow n > 8$$

بنابراین n اعداد طبیعی ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ نمی‌تواند باشد.

۲- گزینه ۲ چون a عضو بازه است، پس

$$2a-1 < a < 3-3a$$

از نابرابری $a < 3-3a$ نتیجه می‌شود $a < 1$ و از نابرابری

$2a-1 < a$ نتیجه می‌شود $a < \frac{3}{4}$. بنابراین باید $a < \frac{3}{4}$. اکنون


توجه کنید که شرط اینکه $(2a-1, 3-3a)$ بازه باشد این است که

$2a-1 < 3-3a$ ، یعنی $a < \frac{4}{5}$. که اگر $a < \frac{3}{4}$ ، این شرط هم برقرار

است. بنابراین مجموعه مقادیر ممکن a بازه $(-\infty, \frac{3}{4})$ است.


۳- گزینه ۴ با توجه به فرض مسئله و شکل زیر، نتیجه می‌شود

$$(b, 4) \cap [-2, a) = (b, a)$$



بنابراین $a = \frac{1}{2}$ و $b = -\frac{1}{3}$. اکنون می‌توان نوشت

$$(b, a) \cup (-2a-1, b) = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}) \cup (-2, -\frac{1}{3}) = (-2, \frac{1}{2}) - \{-\frac{1}{3}\}$$



۴- گزینه ۱ چون اشتراک دو بازه از عدد -2 شروع می‌شود


و $a < a+2$ ، پس $a+2 = -2$ ، یعنی $a = -4$. بنابراین تساوی داده شده به صورت زیر است:

$$[-4, 2] \cap [-2, b) = [-2, 1]$$

چون اشتراک سمت چپ به عدد ۱ ختم شده است و $1 < 2$ ، پس $b = 1$. در نتیجه $a - b = -5$.

۵- گزینه ۳ از روی شکل زیر معلوم می‌شود اجتماع دو بازه

داده شده وقتی برابر \mathbb{R} می‌شود که $3a-1 \leq 2a+1$ ، یعنی $a \leq 2$.



۶- گزینه ۳ در دو حالت زیر، اشتراک دو بازه مجموعه‌ای

تک‌عضوی می‌شود.

حالت اول



$$1-2a = -3 \Rightarrow a = 2$$

حالت دوم



$$1+2a = -5 \Rightarrow a = -3$$

۱۶- گزینه ۲ فرض کنید A مجموعه دانش‌آموزانی باشد که جای دوست ندارند و B مجموعه دانش‌آموزانی باشد که قهوه دوست ندارند. در این صورت

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$= 12 + 15 - n(A \cup B)$$

$$= 27 - n(A \cup B)$$

از طرف دیگر، $n(A \cup B) \geq n(B) = 15$ ، بنابراین

$$n(A \cap B) = 27 - n(A \cup B) \leq 27 - 15 = 12$$

بنابراین حداکثر ۱۲ دانش‌آموز ممکن است که نه جای دوست داشته باشند نه قهوه (توجه کنید که اگر $A \subseteq B$ ، این وضعیت پیش می‌آید).

۱۷- گزینه ۴ ابتدا توجه کنید که

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 12 - n(A \cap B)$$

بنابراین

$$n(A \cup B) = 12 - n(A \cap B) \leq 12$$

و در این نابرابری تساوی وقتی پیش می‌آید که $n(A \cap B) = 0$ ، یعنی $A \cap B = \emptyset$. از طرف دیگر،

$$n(A \cap B) \leq n(A) = 5$$

البته، توجه کنید که در این نابرابری تساوی وقتی برقرار است که $A \cap B = A$ ، یعنی $A \subseteq B$ ، که طبق فرض درست نیست.

بنابراین $n(A \cap B) \leq 4$ و در نتیجه

$$n(A \cup B) = 12 - n(A \cap B) \geq 8$$

یعنی بیشترین مقدار $n(A \cup B)$ برابر ۱۲ و کمترین مقدار آن برابر ۸ است و مجموع آن‌ها برابر ۲۰ است.

۱۸- گزینه ۳ چون $A \subseteq B$ ، پس $A \cup B = B$. از طرف دیگر،

$$A \subseteq B \Rightarrow n(A) \leq n(B)$$

اکنون توجه کنید که

$$14 = n(A) + 2n(B) \leq n(B) + 2n(B) = 3n(B)$$

و چون $n(B)$ عددی طبیعی است، پس $n(B) \geq 5$. بنابراین

$$n(A \cup B) = n(B) \geq 5$$

۱۹- گزینه ۴ توجه کنید که

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$35 = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

بنابراین

$$n(A) - n(A \cap B) = 35 - n(B)$$

از طرف دیگر،

$$n(A \cup B) \leq n(A) + n(B)$$

$$35 \leq 2n(B) + n(B)$$

۱۱- گزینه ۳ اگر $A \cup B$ متناهی باشد، آن‌گاه A و B قطعاً متناهی هستند. چون اگر یکی از آن‌ها نامتناهی باشد، اجتماع آن با هر مجموعه دیگری نامتناهی می‌شود.

۱۲- گزینه ۱ توجه کنید که

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

پس

$$n(A) + n(B) = n(A \cup B) + n(A \cap B) = 24$$

به این ترتیب

$$\begin{cases} n(A) + n(B) = 24 \\ n(A) - n(B) = 4 \end{cases} \Rightarrow n(B) = 10$$

۱۳- گزینه ۱ توجه کنید که

$$A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B \Rightarrow n(A \cup B) = n(B)$$

طبق فرض $n(A \cup B) = 9$ ، پس $n(B) = 9$. از طرف دیگر،

$$n(A) + n(A') = n(B) + n(B')$$

$$n(A) + 14 = 9 + 10 \Rightarrow n(A) = 5$$

۱۴- گزینه ۱ توجه کنید که

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$16 = 24 - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = 8$$

از طرف دیگر،

$$n(B - A) = n(B) - n(B \cap A) \Rightarrow 3 = n(B) - 8 \Rightarrow n(B) = 11$$

در نتیجه $n(A) = 24 - n(B) = 13$. به این ترتیب،

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 13 - 8 = 5$$

۱۵- گزینه ۳ توجه کنید که

$$n(A \cap B) = 2n(A - B) = 2n(A) - 2n(A \cap B)$$

$$n(A) = \frac{3}{2} n(A \cap B)$$

همین‌طور

$$n(A \cap B) = 3n(B - A) = 3n(B) - 3n(A \cap B)$$

$$n(B) = \frac{4}{3} n(A \cap B)$$

اکنون توجه کنید که

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$44 = \frac{3}{2} n(A \cap B) + \frac{4}{3} n(A \cap B) - n(A \cap B)$$

$$= \frac{11}{6} n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B) = 24$$

در نتیجه

$$n(B) = \frac{4}{3} n(A \cap B) = 32$$

بنابراین $3n(B) \geq 35$. در نتیجه، چون $n(B)$ عددی طبیعی است،

پس $n(B) \geq 12$. به این ترتیب

$$n(A-B) = n(A) - n(A \cap B) = 35 - n(B)$$

در نتیجه

$$n(A-B) \leq 35 - 12 = 23$$

۲۰- گزینه ۲ فرض کنید

$$5n(A \cap B) = 3n(A) = 2n(B) = t$$

در این صورت

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= \frac{t}{3} + \frac{t}{2} - \frac{t}{5} = \frac{19t}{30}$$

چون $n(A \cup B)$ عددی طبیعی است، پس $\frac{19t}{30}$ نیز عددی طبیعی

است. کوچک‌ترین عدد طبیعی مانند t که این ویژگی را دارد برابر ۳۰ است، که به ازای آن کمترین مقدار $n(A \cup B)$ به دست می‌آید

که برابر ۱۹ است.